

Indikationen für eine Zervixlängenmessung können sein:

- vorzeitige Kontraktionen
- Mehrlinge
- Status nach Frühgeburt
- Status nach Konisation

Die folgende Tabelle zeigt die Wahrscheinlichkeiten in % für eine Frühgeburt vor 35 Schwangerschaftswochen in Abhängigkeit der Zervixlänge und dem Zeitpunkt der Zervixmessung.

(Nach Berghella. Effect of Gestational Age at Short Cervix. Obstet Gynecol 2007)

		Schwangerschaftswochen													
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Zervixlänge in mm	0	70	69	68	66	65	64	63	62	60	59	58	56	55	54
	5	63	61	60	59	58	56	55	54	52	51	50	48	47	46
	10	55	53	52	51	49	48	47	45	44	43	42	40	39	38
	15	47	45	44	43	41	40	39	38	36	35	34	33	32	31
	20	39	37	36	35	34	33	31	30	29	28	27	26	25	24
	25	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	19
	30	25	24	23	22	21	20	19	19	18	17	16	16	15	14
	35	19	18	18	17	16	15	15	14	13	13	12	12	11	11
	40	15	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
	45	11	11	10	10	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6